

Leukoplakie van het mondslimvlies

Patiënteninformatie van de
Nederlandse Vereniging voor Mondziekten, Kaak- en Aangezichts chirurgie,
de wetenschappelijke vereniging van kaakchirurgen in Nederland
Zie: www.kaakchirurg.nl

Wat is leukoplakie?

Leukoplakie is een witte aandoening van het mondslimvlies. Leukoplakie kan op iedere plaats in de mond voorkomen, soms op meerdere plaatsen tegelijk, en gaat soms gepaard met een branderig gevoel. In een klein percentage van de gevallen kan leukoplakie kwaadaardig worden en overgaan in mondkanker.



Afbeelding: Leukoplakie van de linker tongrand

Hoe ontstaat leukoplakie?

Leukoplakie komt vooral voor boven het veertigste levensjaar, vooral bij mensen die veel roken. Bij geheel stoppen met roken blijken leukoplakieën soms binnen enkele maanden geheel te verdwijnen. Mocht dat niet het geval zijn, dan is advies van de tandarts of de huisarts gewenst.

Hoe wordt de diagnose gesteld?

Er zijn veel witte afwijkingen van het mondslimvlies. In een gering aantal van de gevallen gaat het om leukoplakie. Door een klein weefselstukje uit het veranderde slijmvlies te nemen, kan onder de microscoop worden bekeken of eventueel sprake is van kwaadaardige veranderingen of een voorstadium ervan. Mocht dit het geval zijn dan volgt aanvullend onderzoek.

Wat is de behandeling?

Patiënten die roken worden dringend geadviseerd hiermee te stoppen. Wanneer de leukoplakie na enkele maanden niet is verdwenen, wordt deze verwijderd. Dit kan operatief of door middel van een laserbehandeling waarbij de afwijking wordt verdampt. Bovenstaande behandelingen vinden over het algemeen poliklinisch plaats onder plaatselijke verdoving.

Disclaimer De NVMKA, noch de auteurs, of enige andere partij die betrokken is (zijn) geweest bij het opstellen en openbaar maken van deze pagina's garandeert(en) dat de informatie in elk respect accuraat of compleet is en kan (kunnen) niet verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele fouten, tekortkomingen en/of resultaten verkregen met het gebruik van de aangeboden informatie.

Copyright © Alle informatie bevat in de Internetsite van de NVMKA op www.kaakchirurg.nl is eigendom van de NVMKA, tenzij anders aangegeven. Voor duplicatie van enige informatie van deze pagina's voor redenen anders dan persoonlijk gebruik is toestemming vereist van de NVMKA.

Leukoplakie van het mondslimvlies

Patiënteninformatie van de
Nederlandse Vereniging voor Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie,
de wetenschappelijke vereniging van kaakchirurgen in Nederland
Zie: www.kaakchirurg.nl

Controle

Wanneer bij u een leukoplakie is geconstateerd dan zult u regelmatig voor controle moeten komen. Dit geldt ook voor patiënten die al zijn behandeld voor hun leukoplakie. Een enkele keer kan de leukoplakie na behandeling terugkomen of ontstaan er nieuwe leukoplakieën. Daarom worden patiënten met een leukoplakie vaak langdurig gecontroleerd, met een tijdsinterval van zes tot twaalf maanden. In sommige gevallen kunnen de controles aan de tandarts worden overgelaten.

Mei 2009

Disclaimer De NVMKA, noch de auteurs, of enige andere partij die betrokken is (zijn) geweest bij het opstellen en openbaar maken van deze pagina's garandeert(en) dat de informatie in elk respect accuraat of compleet is en kan (kunnen) niet verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele fouten, tekortkomingen en/of resultaten verkregen met het gebruik van de aangeboden informatie.

Copyright © Alle informatie bevat in de Internetsite van de NVMKA op www.kaakchirurg.nl is eigendom van de NVMKA, tenzij anders aangegeven. Voor duplicatie van enige informatie van deze pagina's voor redenen anders dan persoonlijk gebruik is toestemming vereist van de NVMKA.