




MASSETER HYPERTROFIE



Dosering

Indicaties in het aangezicht en geadviseerde injectie eenheden met Botuline toxine A 100 IU opgelost in 2,5 ml 0,9% zoutoplossing. Dit geeft een oplossing met 4 IU/0,1 ml. De doseringen die in dit artikel worden gebruikt zijn gebaseerd op Vistabel®, dat wordt geleverd in een 50 IU (internationale eenheden) flacon.

Aantal Injectiepunten: 2x3 (3 punten per masseter)

IU per injectiepunt: 12

Totaal IU geïnjecteerd: 72

MI oplossing per injectiepunt: 0,3

Injectiepunten worden bepaald door de spier gedurende aanspannen te palperen. De BoNTA wordt langs de mandibula onderrand op 3 plaatsen geïnjecteerd in het dikste deel van de spier. Bij recidief kan de injectie worden herhaald (minimaal 12 weken na laatste injectie)

Literatuur

- G.W.C. Jaspers, J. Pijpe, J. Jansma. The use of botulinum toxin type A in cosmetic facial procedures. *Int J Oral Maxillofac Surg.* 2011 Feb;40(2):127-33. Epub 2010 Oct 20.
- Cosmetic facial surgery. The application of botulinum neurotoxin type A. G.W.C. Jasper, J. Pijpe, R.H. Schepers, J. Jansma J. Ned Tijdschr Tandheelkd. 2011 Oct;118(10):488-94