Nederlandse Vereniging voor
Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie

MKA-leidraad

HYGIËNE EN INFECTIEPREVENTIE POLIKLINIEK – POLIKLINISCHE BEHANDELKAMER

Handhygiëne: 's ochtends, 's middags: handen wassen met water en zeep, nagels reinigen, handen afdrogen met papieren handdoekje, en handen desinfecteren; na toiletbezoek handen wassen met water en zeep, handen afdrogen met papieren handdoekje en handen desinfecteren.

Onderzoek en behandeling:

A. **Tandheelkundige behandelingen zonder bloedcontact en aërosol**:
intra- en extraoraal onderzoek; het geven van lokale anesthesie; intra-orale röntgenopnamen en dia's; fluoride applicatie
->->-> niet-steriele handschoenen, geen mondmasker en beschermbril, gesteriliseerd instrumentarium

B. **Tandheelkundige behandelingen met bloedcontact en aërosol**:
extracties van gebitselementen; biopteren; aanbrengen en verwijderen van dentale spalk; subgingivaal tandsteen verwijderen en curettage
->->-> steriele operatiehandschoenen; mondmasker type IIR en beschermbril; gesteriliseerd instrumentarium; patiënt afdekken; tablet met niet-steriel, niet-vochtdoorlatend servet

C. **Standaard poliklinische kaakchirurgische behandelingen**:
Operatieve dento-alveolaire behandelingen op de poliklinische behandelkamer (operateur en assisterende)
->->-> bij start van het behandelprogramma (voor de 1e patiënt) handen wassen met water en zeep, nagels reinigen, handen afdrogen met papierenhanddoekje en handen desinfecteren; disposable mondmasker type IIR, beschermbril, disposable muts; onsteriele jas en steriele operatiehandschoenen; gesteriliseerd en steriel verpakt instrumentarium; patiënt afdekken met steriele doeken; Na de ingreep handdesinfectie; bij iedere volgende patiënt dezelfde procedure zonder handen wassen, maar wel altijd handdesinfectie.
Bij iedere volgende patiënt: handdesinfectie, nieuw mondmasker, beschermbril zo nodig schoonmaken met alcohol of chloorhexidine.

Handvat lamp:
- na elke patiënt conform A of B: desinfecteren met alcohol 70% of chloorhexidine in alcohol desinfectans
- na elke patiënt conform C: verwisselen of nieuwe steriele sleeve plaatsen

Meerfunctie-spuit/disposable afzuigtip:
spuit in steriele verpakking monteren; vóór gebruik verpakking verwijderen; na gebruik spuit verwisselen; koppelstuk afzuigslang afnemen met alcohol 70%; afzuigslang elke dag doorspoelen; steriele afzuigslang alleen gebruiken bij bloedingen.

Addendum tav Corona Mondzorg:
Kern van de problematiek is het risico op transmissie van Corona zo laag mogelijk te houden door goede triage vooraf conform de meest actuele KNMT richtlijn Leidraad Mondzorg Corona.
In geval van COVID besmette/verdachte patiënten wordt verwezen naar de meest actuele richtlijn van de KNMT Werkinstructie Spoedzorg COVID-19 in de Tandartspraktijk. In de ziekenhuis omgeving betekent dit dat patiënten behandeld worden met PBM inclusief; disposable overjas, (steriele)handschoenen, disposable gelaatsscherm, FFP2 mondmasker (of code N95/KN95) en

disposable operatiemuts. Dit betekent ook dat bij **Tandheelkundige behandelingen zonder bloedcontact en aërosol**: intra- en extra-oraal onderzoek; het geven van lokale anesthesie; intra-orale röntgenopnamen en dia's; fluoride applicatie aanvullende maatregelen ter voorkoming van transmissie moeten worden genomen door het gebruik van mondmasker type IIR, beschermbril en niet steriele handschoenen.

Literatuur

- Richtlijn Infectiepreventie in mondzorgpraktijken, KNMT 2016
- Algemene Voorzorgsmaatregelen Hygiëne en Infectiepreventie. Richtlijn UMCG, 2010
- Leidraad Mondzorg Corona versie 8,0, laatste update 13-07-2021
- Werkinstructie spoedzorg Covid-19 in de tandartsprakitjk, versie 5,0